ゴム製哺乳用具中の*N*-ニトロソアミン含有量調査（1988-2007）*

水石和子，浜野朋子，荻野周三

[正誤表 Errata]

東京健安研セ年報 *Ann. Rep. Tokyo Metr. Inst. Pub. Health*, **59**, 121-125,2008

ゴム製哺乳用具中のN-ニトロソアミン含有量調査 (1988-2007)

N-Nitrosoamine Content in Rubber Nipples and Pacifiers, 1988-2007

125 ページ 英文の著者名と脚注

[正 Correct]

Kazuko MIZUISHI*, Tomoko HAMANO* and Shuzo OGINO*

* Tokyo Metropolitan Institute of Public Health

3-24-1, Hyakunin-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0073 Japan

ゴム製哺乳用具中の*N*-ニトロソアミン含有量調査 (1988-2007) *

水石和子**, 浜野朋子**, 荻野周三***

都内流通ゴム製乳首及びおしゃぶり中の*N*-ニトロソアミン(NNA)及びニトロソ化可能化合物(酸性条件でニトロソアミンに変化する化合物)について, 1988年から2007年にわたり調査を行った. 乳首及びおしゃぶり計262検体について, 中性水溶液(人工唾液)を用いる溶出試験を行った結果, 48検体から*N*-ニトロソジメチルアミン, *N*-ニトロソジエチルアミン, *N*-ニトロソジ-*n*-ブチルアミン, *N*-ニトロソピペリジンを検出した. NNA及びニトロソ化可能化合物の総量は1-122 ng/gの範囲で, 1989年に最高値122 ng/gを検出したが, その後は減少傾向で, 2001年以降は検出されていない. NNA減少の要因はゴム製造に際して使用される配合剤(加硫促進剤)の改良やRIM(室温, 低温架橋タイプの射出成形)液状のシリコンゴム製品の増大などあげられる.

キーワード: *N*-ニトロソアミン, ニトロソ化可能化合物, ゴム製哺乳用具, 乳首, おしゃぶり, 溶出試験

はじめに

1980年代に哺乳用具のゴム製乳首に発ガン物質として知られる*N*-ニトロソアミン(NNA)及びその前駆物質の第2級アミンが含まれていることがヨーロッパで報告され大きな社会問題となった¹⁾. 1980年代半ばには, 欧米などの諸外国では乳幼児が使う乳首やおしゃぶりについて一般のゴム製品より厳しい規格基準が設定され, NNAについて規制措置がとられた. 日本では1986年にゴム製哺乳用具に関する規格基準が設定されたが²⁾, ゴム製乳首やおしゃぶり中の加硫促進剤由来のNNAについての規制措置はない.

当センターでは, 都の衛生行政の立場から問題の重要性を認識して, 1982年から都内の市販乳首, おしゃぶりなどについてNNAの含有量調査を行ってきた. 1987年度までの調査結果は既報のとおりである³⁻⁶⁾. わが国では, ゴム製哺乳用具中のNNA含有量は欧米での規制措置以後急激に減少した. 今回は1988年以降の都内流通ゴム製乳首, おしゃぶりについてのNNA及び酸性条件でニトロソアミンに変化するニトロソ化可能化合物の含有量の推移を報告する.

実験方法

1. 試料

1988年4月から2007年8月の期間内(但し1992年を除く)に都内に流通したゴム製乳首, おしゃぶり計約262検体を調査試料とした. 試料は1)天然ゴム製, 2)イソプレンゴム製, 3)シリコンゴム製, 製品は日本製, 外国製(米国と西独製)である.

2. 試薬

i) NNA標準溶液:*N*-ニトロソジメチルアミン(NDMA), *N*-ニトロソジエチルアミン(NDEA), *N*-ニトロソジ-*n*-ブチルアミン(NDBA), *N*-ニトロソジ-*n*-プロピルアミ

ン(NDPA), *N*-ニトロソピペリジン(NPi), *N*-ニトロソモルフォリン(NMor)の混合NNA標準溶液は既報^{3, 4)}に準じて調製した. ii) 人工唾液: 炭酸水素ナトリウム4.2g, 炭酸カリウム0.2g, 塩化ナトリウム0.5g及び亜硝酸ナトリウム30mgを1Lの精製水に溶かした.

3. 装置及び測定条件

TEA-GC: Thermo Fisher 社製熱エネルギー分析器TEA543に島津製ガスクロマトグラフGC-14Aを連結して使用した. GCの分離カラムはPEG-20M+KOH(10+5)%, 100/120メッシュを内径3.2mm, 長さ2.5mのガラスカラムに充てんしたものを使用した. カラム温度: 180°C(恒温), 注入口温度: 200°C; 検出器温度: pyrolyzer, 550°C, インターフェイス, 250°C.

4. 分析法

既報^{3, 4)}に従って行った.

結果及び考察

今回調査した試料は, 材質が天然ゴム製87, イソプレンゴム製28, シリコンゴム製133及び材質不明14(1996年度分)の計262検体で, 外国製は92検体(35.1%)であった.

(Table 1) NNA及びニトロソ化可能化合物の溶出は, 天然ゴム製は33, イソプレンゴム製は3, シリコンゴム製は12の計48検体からみられた.

Table 2にNNA及びニトロソ化可能化合物を検出した試料の種類, 材質と検出値を示した. 今回の調査では, 中性水溶液(人工唾液, pH 8.5)中に溶出したNNAはいずれもNDMAとNDEAであった. 1989年は3検体(合計量2-11 ng/g), 1990年は8検体(2-4 ng/g), 1991年は3検体(2-15 ng/g), 1993年は1検体(2 ng/g), 1994年は1検体(2 ng/g), 1996年は1検体(1 ng/g), 1997年は1検体(2 ng/g), 2000年は1検体(1 ng/g)

* 東京衛研年報 39, 97-100, 1988, ** 東京都健康安全研究センター医薬品部微量分析研究科 169-0073 東京都新宿区百人町 3-24-1, *** 東京都健康安全研究センター医薬品部

が検出された。1988年, 1995年, 1998年及び2001年以降は検出していない(検出限界1 ng/g)。中性水溶液を塩酸で酸性水溶液(pH1)とし30分室温で放置後生成したニトロソ化可能化合物はNDMA, NDEA, NDBA及びNPIで, NDPA

Table 1. Number of Samples Examined from 1988 to 2007

Year ¹⁾	Rubber Materials ²⁾				Total
	NR	IR	Q(Si) ³⁾	Unknown	
1988	11(3) ³⁾	1	3		15(3)
1989	11(9)	2(1)	2(2)		15(12)
1990	10(8)	2	5(1)		17(9)
1991	13(5)	2(1)	4(2)		19(8)
1993	8(1)	2	6(2)		16(3)
1994	5(2)	2	9		16(2)
1995	7	2	5		14
1996	2(2)			14	16(2)
1997	2(1)	2	9(5)		13(6)
1998	4	1	7		12
1999	5(1)	1(1)	9		15(2)
2000	1(1)	1	9		11(1)
2001	1	2	11		14
2002	1	2	14		17
2003	1	2	15		18
2004	1	1	14		16
2005	1	1	9		11
2006	1	1	1		3
2007	2	1	1		4
Total	87(33)	28(3)	133(12)	14	262(48)

1) no sample in 1992

2) NR:Natural Latex, IR:Isopren, Q(Si):Silicon

3) number of samples which NNA and nitrosatable compounds migrated

Fig. 1. Distribution of Amounts of N-Nitrosamines and Nitrosatable Compounds Migrated from Rubber Nipples and Pacifiers(1988-2007)

及びNMorは生成されなかった。NDBAは1989年の天然ゴム製の乳首1検体から23 ng/g検出し, NPIも同年の天然ゴム製の乳首1検体から9 ng/g, 天然ゴム製のおしゃぶり3検体から6-29 ng/g検出した。NDBAとNPIを検出したのは1989年の試料のみで, 他の年はNDMAとNDEAが検出された。ニトロソ化可能化合物の検出は, 1988年は3検体(合計量17-23 ng/g), 1989年は12検体(1-122 ng/g), 1990年は9検体(3-35 ng/g), 1991年は7検体(1-10 ng/g), 1993年は3検体(2-21 ng/g), 1994年は2検体(1-2 ng/g), 1996年は2検体(1 ng/g), 1997年は6検体(1-4 ng/g), 1999年は2検体(1-3 ng/g), 2000年は1検体(17 ng/g)であった。

中性の水溶液中に溶出したNNAと酸性にした水溶液中のニトロソ化可能化合物の総量を分布図としてFig.1に示した。NNA及びニトロソ化可能化合物が検出された試料数は1989年から1991年が多く, それぞれ15検体中12検体, 17検体中9検体及び19検体中8検体から検出した。1993年以降は検出数が減少している。また, 1989年の試料から今回の調査で最も高い122 ng/gを検出し, その後1990年は37 ng/g, 1991年は22 ng/g, 1994年は4 ng/gと減少している。2000年に18 ng/g検出されたが, 2001年以降はNNA, ニトロソ化可能化合物ともに検出されていない。

考察及びまとめ

ゴム製哺乳用具中に生成するNNAはゴムの製造工程に添加される配合剤に起因し, 製造工程中に加硫促進剤などの配合剤が添加される天然ゴム, イソプレンゴム製の哺乳用具からはNNAが高濃度で検出される。1988年から2007年までの今回の調査でもNNA及びニトロソ化可能化合物が検出された48試料中33検体が天然ゴム製であった。総検出量は1-122 ng/gの範囲であったが, これらのうち, 西独が定めたゴム製乳首についてのNNA規制値(総量が, 中性で10 ng/g以下, 酸性で100 ng/g以下)⁷⁾を超えたものは, 1989年の天然ゴム製乳首1検体及び天然ゴム製のおしゃぶり2検体, 1991年のシリコンゴム製乳首1検体で, 1993年以降は規制

値を超えるものはなかった。また, シリコンゴム製12検体からNNA及びニトロソ化可能化合物が検出されたが, 一般的に天然ゴム製に比べて低値であった。NNAはゴムの製造, 保存, 流通の過程に生ずる可能性があり, ニトロソ化は自然条件下で起きることが報告されている。シリコンゴム製品の場合も自然条件下で生じたNNAのコンタミネーション(汚染)が原因と考えられる。

Table 2. Contents(ng/g) of *N*-Nitrosamines and Nitrosatable Compounds Migrated from Rubber Nipples and Pacifiers

Year	Samples	Rubber Materials ¹⁾	<i>N</i> -nitrosamines ²⁾		Total (I)	Nitrosatable Compounds ²⁾				Total (II)	Amount of I and II
			NDMA	NDEA		NDMA	NDEA	NDBA	NPi		
1988	pacifier	NR	- ³⁾	-	-	15	4	-	-	19	19
	pacifier	NR	-	-	-	17	-	-	-	17	17
	nipple	NR	-	-	-	9	24	-	-	23	33
1989	nipple	NR	11	-	11	60	8	23	-	91	102
	nipple	Q(Si)	1	1	2	2	-	-	-	2	4
	pacifier	NR	-	6	6	13	52	-	-	65	71
	pacifier	NR	-	-	-	13	-	-	-	13	13
	nipple	NR	-	-	-	3	4	-	-	7	7
	nipple	NR	-	-	-	1	-	-	-	1	1
	nipple	Q(Si)	-	-	-	4	-	-	-	4	4
	nipple	IR	-	-	-	3	3	-	-	6	6
	nipple	NR	-	-	-	6	8	-	9	23	23
	pacifier	NR	-	-	-	39	54	-	29	122	122
	pacifier	NR	-	-	-	38	49	-	23	110	110
	pacifier	NR	-	-	-	27	30	-	6	63	63
	1990	nipple	NR	-	2	2	2	9	-	-	11
nipple		NR	-	3	3	1	8	-	-	9	12
nipple		NR	-	4	4	-	3	-	-	3	7
nipple		NR	-	4	4	-	14	-	-	14	18
pacifier		NR	-	2	2	-	35	-	-	35	37
pacifier		NR	-	2	2	-	21	-	-	21	23
nipple		NR	1	1	2	2	2	-	-	4	6
nipple		Q(Si)	-	-	-	5	-	-	-	5	5
pacifier		NR	-	2	2	-	15	-	-	15	17
1991	nipple	NR	4	-	4	-	1	-	-	1	5
	nipple	Q(Si)	2	-	2	-	-	-	-	2	2
	pacifier	NR	-	-	-	-	3	-	-	3	3
	nipple	IP	-	-	-	-	10	-	-	10	10
	nipple	Q(Si)	10	5	15	4	3	-	-	7	22
	pacifier	NR	-	-	-	2	-	-	-	2	2
	pacifier	NR	-	-	-	1	-	-	-	1	1
	pacifier	NR	-	-	-	-	3	-	-	3	3
1993	nipple	Q(Si)	-	-	-	2	-	-	-	2	2
	nipple	NR	-	-	-	2	19	-	-	21	21
	pacifier	Q(Si)	2	-	2	2	-	-	-	2	4
1994	nipple	NR	2	-	2	2	-	-	-	2	4
	pacifier	NR	-	-	-	1	-	-	-	1	1
1996	nipple	NR	-	1	1	1	-	-	-	1	2
	pacifier	NR	-	-	-	1	-	-	-	1	1
1997	pacifier	Q(Si)	-	-	-	-	2	-	-	2	2
	nipple	NR	-	-	-	-	2	-	-	2	2
	nipple	Q(Si)	-	-	-	1	-	-	-	1	1
	nipple	Q(Si)	-	-	-	-	1	-	-	1	1
	nipple	Q(Si)	-	-	-	-	1	-	-	1	1
	nipple	Q(Si)	-	2	2	-	4	-	-	4	6
1999	nipple	NR	-	-	-	1	2	-	-	3	3
	nipple	IR	-	-	-	1	-	-	-	1	1
2000	pacifier	NR	-	1	1	-	17	-	-	17	18

1) NR :Natural Latex, IR :Isoprene, Q(Si) :Silicon

2) NDMA :*N*-nitrosodimethylamine, NDEA :*N*-nitrosodiethylamine, NDBA :*N*-nitrosodi-*n*-butylamine, NPi :*N*-nitrosopiperidine

3) not detected (detection limit <1 ng/g)

NNA生成の原因となる配合剤を使用しない天然ゴム製のものからNNAが検出される場合もコンタミネーションと考えられる。

本調査の結果, NNA 及びニトロソ化可能化合物の検出は1989年から1991年がピークで, その後は検出数, 検出量とも減少して2001年以降検出されていない。その大きな理由として, ゴム製造時に NNA 生成の原因化合物の配合剤を使用しない結果と考えられる。近年は, 配合剤を使わない合成のシリコーンゴム製哺乳用具が多く市販されており, 市販のゴム製哺乳用具からの NNA 検出はほとんどが検出限界以下である。わが国ではゴム製哺乳用具についての NNA 問題は改善がみられたといえる。

文 献

- 1) Spiegelhalter, B. and Preusmann, R.: Proceeding of the 7th International Meeting on Analysis and Formation of Nitroso Compounds, p 231 Tokyo, 1981
- 2) 厚生省告示 85 号, 官報 1986.4.1
- 3) 水石和子, 竹内正博, 吉原武俊: 東京衛研年報, **34**, 146-149, 1983.
- 4) 水石和子, 竹内正博, 風間成孔: 東京衛研年報, **35**, 127-132, 1984.
- 5) 水石和子, 竹内正博, 風間成孔: 東京衛研年報, **36**, 146-148, 1986.
- 6) 水石和子, 竹内正博, 風間成孔: 東京衛研年報, **39**, 97-100, 1988.
- 7) BGBL. IS., 1945, 1981

***N*-Nitrosoamine Content in Rubber Nipples and Pacifiers, 1988–2007**

A survey of *N*-Nitrosoamine (NNA) in rubber nipples and pacifiers in the market in Tokyo was performed from 1988 to 2007. The amounts of NNA and nitrosatable compounds were determined by the migration test method using buffer solution (simulated saliva solution containing nitrite). A total of 264 rubber nipples and pacifiers were examined. The NNA compounds *N*-nitrosodimethylamine (NDMA), *N*-nitrosodiethylamine (NDEA), *N*-nitrosodi-*n*-butylamine (NDBA), and *N*-nitrosopiperidine (NPI) were migrated from 49 samples. The total concentrations of NNA and nitrosatable compounds migrated from samples were in the range of 1–122 ng/g. NNA compounds were detected at the highest level, 122 ng/g, in 1989. The levels decreased after 1990, and NNA and nitrosatable compounds have not been detected since 2001. The improvement in accelerators and stabilizers used to manufacture rubber products has prevented the formation of NNA in these products, and increasing use of silicon materials contributes to NNA-free rubber products.

Keywords: *N*-nitrosoamine, nitrosatable compound, nursing rubber goods, nipple, pacifier, migration test

---

* 東京衛研年報 39, 97-100, 1988, ** 東京都健康安全研究センター医薬品部微量分析研究科
169-0073 東京都新宿区百人町 3-24-1, *** 東京都健康安全研究センター医薬品部